



INFO

PLAN NATIONAL FRELOM ASIATIQUE

PAYS DE LA LOIRE

Bulletin d'information
édité par :



Section
apicole



GDS
Pays de la Loire



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
PAYS DE LA LOIRE

avec le soutien de



[Le plan national frelon asiatique à pattes jaunes](#), est porté et coordonné par OVS animal et OVS végétal France réunis au sein de l'AFSE (association française sanitaire et environnementale). Il se veut offensif vis-à-vis du frelon asiatique à pattes jaunes, attentif et scrupuleux vis-à-vis de l'entomofaune. Ce plan d'action définit les protocoles et les équipements à utiliser (validés sur des critères d'efficacité et de limitation des risques pour les hommes et la faune). En Pays de la Loire, son déploiement est soutenu par la section apicole du GDS et la Chambre d'agriculture de Région.

Février
2025

Le frelon asiatique, aussi appelé frelon à pattes jaunes, occasionne de lourdes pertes dans les ruchers et parmi les populations d'insectes, contribuant ainsi à l'appauvrissement de la biodiversité. Sa présence perturbe certaines activités humaines. Il représente un danger pour les personnes allergiques aux piqûres d'hyménoptères. Son classement en espèce exotique envahissante, permet d'envisager des moyens pour s'en protéger. Le plan national de lutte officialisé début 2024 préconise, entre autres, de pratiquer le piégeage du frelon à pattes jaunes au printemps.

Les femelles frelon fécondées à l'automne (aussi appelées *fondatrices*) passent l'hiver à l'abri dans des souches, des cavités... Dès que les températures avoisinent les 12 degrés (soit à peu près à la mi-février en Pays de la Loire), elles sortent des abris et se mettent en action pour fonder une colonie.

D'abord, chacune va construire un petit nid primaire. Les œufs qu'elles y pondent donneront naissance à un groupe d'ouvrières dont le rôle sera de construire un nid secondaire, beaucoup plus gros, où s'installera la colonie.

agressif, sauf lorsqu'il se sent menacé. Il vaut donc mieux faire intervenir un professionnel pour éviter d'être piqué.

2 • En piégeant les fondatrices avant qu'elles ne se cloîtent dans leur nid secondaire. Lorsque la construction des gros nids, est terminée (fin mai - début juin), les reines fondatrices s'y installent (une par nid). Une fois dans ces nids, elles n'en sortent plus. Le reste de leur vie est consacré à engendrer les membres de la colonie, soit environ 13 000 frelons au cours de la saison. Pour se nourrir,

AGIR AVANT QU'IL SOIT TROP TARD



De la grosseur d'une balle de tennis, on trouve les **nids primaires** sous les rebords de toit, dans les abris de jardin, les greniers...

1 • En détruisant les petits nids primaires alors qu'ils sont toujours occupés. Cela permet d'éviter la création d'une colonie plus importante. Il faut pour cela agir tard en soirée, quand la fondatrice s'y trouve (si elle n'y est pas, elle construira un nouveau nid ailleurs). Le frelon asiatique n'est pas particulièrement

C'est dans les **nids secondaires** que les colonies se développent. Ils peuvent mesurer jusqu'à 80 cm de diamètre. Ils se trouvent généralement en hauteur dans les arbres, mais aussi quelquefois dans des haies.



Plan national d'action frelon à pattes jaunes : le piégeage de printemps

janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
				Destruction des nids primaires & piégeage printemps					Piéger les fondatrices AVANT leur installation dans le nid secondaire		